

Kortisol, referensvärden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

| Region      | Plasma /Serum | S-Kortisol kl. 08 | S-Kortisol kl. 23 | Saliv-Kortisol kl. 08 | Saliv-Kortisol kl. 23 | dU-Kortisol |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Dalarna     | S             | 250-750           | 50-300            | AS                    | AS                    | AS          |
| Gävleborg   | P             | 150-600           | 40-400            |                       |                       | AS          |
| Sörmland    | S             | 240-730           |                   |                       |                       |             |
| Värmland    | S             | 120-630*          | 46-390*           |                       |                       | USÖ         |
| Västmanland | S             | 250-750           | 50-300            |                       |                       | 40-170 KS   |
| Örebro      | S             | 200-800           |                   | AS                    | AS                    | 30-145      |
| Uppsala     | S             | 170-500           | 75-290            | 6,2-38                | 0,6-4,9               | 40-170      |

Oktober 2019, samtliga värden i nmol/L.

AS akademiska sjukhuset Uppsala, USÖ universitetssjukhuset Örebro, KS Karolinska sjukhuset

\* före kl.10.00 resp. efter kl.17.

Enligt Equalis, expertgruppen för endokrinologi, augusti 2017, kan prover som analyserats med metod från Beckman, Ortho, Roche och Siemens Immulite använda sig av följande riktlinjer:

”Ostressat morgonprov för P-kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen P-Kortisol >450 nmol/L. P-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing’s syndrom. Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.”